С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ¹, В.П. ПОЛЯНСЬКА², С.В. ЗАЧЕПИЛО¹

**КЛІНІЧНА ТА МІКРОБІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
«БІОПЛАЗМІКСУ СПРЕЮ ДЛЯ ГОРЛА» В ЛІКУВАННІ
ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ**

¹*Каф. оториноларингології з офтальмологією (зав. – проф. С.Б. Безшапочний),*

²*Каф. мікробіології, вірусології та імунології (зав. – проф. Г.А. Лобань)*

Полтавського державного медичного університету

(ректор – проф. В.М. Ждан)

Запальні захворювання глотки займають значиме місце в практичній діяльності як лікарів-оторингологів, так і лікарів загальної практики сімейної медицини. На особливу увагу клініцистів заслуговує хронічний тонзиліт (ХТ), якому належить одне з провідних місць в структурі ЛОР-патології за частотою виникнення. Поширеність ХТ на сьогодні залишається високою. За даними наукових джерел, на ХТ хворіють від 12,5 до 22,1% населення, що становить від 22% до 40% серед усіх хронічних отоларингологічних нозологій [5, 28]. Слід зазначити, що в останні роки частота хронічного запалення мигдаликів зросла у 1,5-1,8 рази [5]. Широка поширеність даної патології та її можливий негативний вплив на органи і системи макроорганізму визначають актуальність проблеми профілактики та ефективного лікування хворих на ХТ.

Хронічний неспецифічний тонзиліт є захворюванням інфекційно-алергічного характеру з місцевими проявами у вигляді стійкої запальної реакції мигдалика, що морфологічно виражається одночасними процесами альтерації, ексудації та проліферації, і пов'язане з пригніченням неспецифічних факторів природньої резистентності макроорганізму, порушенням гуморальної та клітинної ланки імунітету [11, 20, 23, 28]. В теперішній час змінюються погляди на питання етіології, патогенезу та класифіка-

ції хронічного тонзиліту. Так, на сьогодні, тонзиліт пропонують визначати як запалення мигдаликів понад їх фізіологічну норму, а термін «хронічний» змінити на «рекурентний» [25]. В нинішній період лікарі в своїй практичній діяльності використовують класифікацію ХТ згідно чинної МКХ-10 (J-35). Більшість дослідників відзначають, що основну роль у розвитку хронічного запалення піднебінних мигдаликів відіграють мікроорганізми [13, 23, 28].

У здорових осіб на поверхні слизової оболонки ротової частини глотки, а також усередині лакун піднебінних мигдаликів постійно присутні чисельні види мікроорганізмів, які формують резидентну (індигенну, аутохтонну, постійну) мікрофлору, що становить основну частку (98-99%) популяції біотопу [9, 10]. Ротова частина глотки є середнім відділом глотки, в якому здійснюється перехрест травного та дихального шляхів. Такі анатомічні особливості обумовлюють постійне потрапляння та взаємодію з макроорганізмом великої кількості мікроорганізмів, які надходять з продуктами харчування, водою та повітрям, і значною мірою визначають формування мікроекології ротоглотки та суміжних з нею органів [7]. Представниками резидентної мікрофлори ротоглотки, які найчастіше висіваються, є дифтеріїди, α -гемолітичні стрептококи, а також γ -гемолітичні стрептококи, *Lactobac-*

terium spp., *Bifidobacterium spp.*, *Actinomyces spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Neisseria spp.*, *Peptostreptococcus spp.*, *Prevotella spp.*, *Treponema spp.*, *Veilonella spp.*, *Candida albicans* [7, 22, 26]. Мікробіоценоз ротоглотки в нормі знаходиться в стані динамічної рівноваги, і є важливим корисним для макроорганізму механізмом неспецифічного захисту, що забезпечує безперервну антигенну стимуляцію імунної системи і формує колонізаційну резистентність щодо інших, в тому числі і патогенних, мікроорганізмів [7, 9]. Колонізаційна резистентність спрямована на підтримку стабільності мікроекології біотопів за рахунок еволюційно сформованих відносин між симбіонтами та забезпечує попередження їх заселення патогенними мікроорганізмами. Порушення складових колонізаційної резистентності слизової оболонки ротоглотки, в тому числі і поява патогенних мікроорганізмів, таких як *S. aureus* та *St. pyogenes*, призводить до дисбіозу та створює умови для розвитку інфекційного процесу та імунного дисбалансу, клінічними проявами яких є персистуючий перебіг запальних процесів, перехід запалення в хронічну форму, часті загострення, низька ефективність традиційної терапії [19].

Обов'язковою умовою ефективного лікування будь-якої патології на тлі дисбіотичних порушень є їх усунення [8]. За даних умов застосування антибіотиків і антисептиків, незважаючи на їх широкий антимікробний спектр, не завжди є доцільним та обґрунтованим та має, на нашу думку, низьку надійність. По-перше, при довготривалій дії антибіотиків та антисептиків формується стійкість мікроорганізмів до них, що потребує їх комбінації з іншими антимікробними засобами та неодноразової заміни, а також можливої зміни режиму дозування [4, 26, 27]. По-друге, застосування антибіотиків та місцевих антисептиків може посилювати вже наявні дисбіотичні порушення [6, 14, 29, 31]. По-третє, місцеве застосування антисептиків не виключає їх токсичну дію та розвиток алергічних реакцій [2, 32]. Таким чином, в останні роки в лікуванні інфекцій різних локалізацій зростає зацікавленість до використання бактерійних препаратів, а саме пробіотиків, які містять апатогенні для

людини мікроорганізми, дія яких, за визначенням ВООЗ, базується на конфлікті між мікроорганізмами і спрямована на відновлення мікробіоценозів різних біотопів людини та їхньої функціональної активності [30].

Тому метою даного дослідження є оцінка клінічної та мікробіологічної ефективності застосування пробіотичного комплексу «Біоплазмікс спрей для горла» в лікуванні ХТ.

Матеріали і методи

В дослідженні брали участь 52 пацієнти віком від 18 до 45 років з компенсованою формою хронічного неспецифічного тонзиліту, серед яких було 34 жінки та 18 чоловіків. Критерії включення: наявність скарг та об'єктивних ознак ХТ. Критерії виключення: вагітність, наявність в анамнезі перенесеної ангіни або ГРВІ впродовж останніх 2 тижнів, прийом системних або місцевих антисептиків/антибіотиків протягом останнього місяця, тяжкі соматичні або психічні захворювання (зокрема, наркоманія і алкоголізм), імунокомпроментовані особи. Дослідження проводилось на базі ЛОР-відділення КП «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради». Діагноз встановлювали на підставі скарг хворих (дискомфорт у горлі, відчуття стороннього тіла у горлі, неприємний запах з рота, виділення гнійно-казеозних пробок), даних анамнезу та фарингоскопічних ознак ХТ (гіперемія та валикоподібного потовщення країв піднебінних дужок (симптоми Гізе та Б.С. Преображенського), рубцевих злук між мигдаликами та піднебінними дужками, розрихлених або рубцево змінених та ущільнених мигдаликів, наявністю казеозно-гнійних пробок або рідкого гною у лакунах мигдаликів), а також регіонарного лімфаденіту – збільшення щелепних лімфовузлів [20, 23, 28]. Для встановлення діагнозу ХТ необхідна наявність трьох із п'яти клінічних ознак, обов'язково – регіонарного лімфаденіту.

Всі хворі були розподілені на 2 групи залежно від курсу отриманого лікування. До 1-ї групи увійшли 26 пацієнтів, яким місцево застосовували «Біоплазмікс спрей для горла», що містить в собі бактеріальний компонент: *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheni-*

formis, *Bacillus amyloliquefaciens*, *Bacillus pumilus*, *Bacillus megaterium* не менше 1×10^6 КУО/мл (мл) та комплекс ферментів бактерій роду *Bacillus* (виробник Гелінгхем Гмбх&Ко. КГ, Німеччина). Пацієнтам 2-ї групи (26 осіб) застосовували традиційний курс лікування: промивання лакун мигдаликів антисептичним засобом – декаметоксином в концентрації 0,2 мг/мл (препарат Декасан, виробник ТОВ «Юрія-фарм», м. Київ, Україна), який має широкий спектр протимікробної (антибактеріальної, протигрибової, противірусної) активності. Курс лікування в обох групах тривав 10 діб.

Ефективність лікування оцінювалась за клінічними, фарингоскопічними та мікробіологічними показниками до та на 10-у добу від початку лікування. Тривалість періоду ремісії патологічного процесу потребує певного часу для об'єктивного вивчення та продовжує нами оцінюватися. Наявність та динаміка клінічних і фарингоскопічних ознак оцінювалась за 4-бальною шкалою (від 0 до 3 балів), де 0 – їх відсутність, а 3 – максимальна вираженість [12].

Статистичний аналіз отриманих результатів здійснювався за допомогою стандартних пакетів програм «SPSS 13.0» «Microsoft Excel 2010». Наявність відмінностей між досліджуваними показниками оцінювалась за t-критерієм Стюдента. Результати вважались статистично значимими при значеннях $p < 0,05$.

Для визначення мікробного пейзажу даного біотопу та його зміни в процесі лікування проводилось бактеріологічне дослідження. Збір матеріалу здійснювався на щеле за допомогою стерильного шпателя та ложки Фолькмана. Отриманий матеріал поміщали в пробірки з транспортним середовищем Еймса та доставляли в бактеріологічну лабораторію протягом 2 годин в ізотермічних умовах. Бактеріологічне дослідження виконувалось у відповідності до методичних рекомендацій J. Vandepitte та співавторів [15]. Ідентифікація виділених культур проводилась за морфологічними, тинкторіальними, культуральними та біохімічними властивостями. Кількість мікроорганізмів у досліджуваному матеріалі визначалась за показниками мікробного обсіменіння (популяційний рівень бактерій) шля-

хом підрахунку колонієутворюючих одиниць в 1 мл (КУО/мл) [13, 16, 17]. Мікроорганізми оцінювались як діагностично значимі при їхньому виділенні в кількості більше, ніж 10^3 - 10^4 КУО [13, 22].

Результати дослідження та їх обговорення

У пацієнтів обох досліджуваних груп відмічалася наявність скарг та фарингоскопічних ознак ХТ до початку лікування та їхній поступовий регрес в процесі лікування а також після його завершення. Динаміка основних скарг хворих зазначених груп під час лікування відображена на рис. 1 та 2. Дані діаграм свідчать про зменшення вираженості симптомів по завершенню курсу лікування. В групі використання «Біоплазміксу спрею для горла» було відмічено достовірне зниження інтенсивності скарг, найбільш виражене на 10-у добу лікування (рис. 1), в той час коли пацієнтів групи, де застосовувався декаметоксин, продовжувало турбувати відчуття дискомфорту та стороннього тіла у горлі (рис. 2).

Рис. 1. Динаміка основних симптомів пацієнтів групи використання «Біоплазміксу спрею для горла» до та після лікування.

Рис. 2. Динаміка основних суб'єктивних симптомів пацієнтів групи застосування декаметоксину до та після лікування.

При проведенні орофарингоскопії відмічалась позитивна динаміка місцевих ознак у пацієнтів обох досліджуваних груп. У 91% хворих групи використання «Біопла-

змікс спреї для горла» зменшилися запальні прояви з боку лімфовузлів та зник казеозно-гнійний вміст лакун піднебінних мигдаликів. Слід зазначити, що у всіх пацієнтів цієї групи регрес таких симптомів, як гіперемія та валікоподібне потовщення вільних країв піднебінних дужок, відмічався в меншому ступені, ніж інші фарингоскопічні ознаки (розрихленість та набряк піднебінних мигдаликів, наявність рідкого гною в лакунах). Динаміка місцевих ознак у хворих групи застосування декаметоксину достовірно не відрізнялась від показників пацієнтів 1-ї групи.

Виразеність ознак хронічного запального процесу в піднебінних мигдаликах залежить від багатьох факторів, провідним із яких, на нашу думку та думку інших науковців, є порушення динамічної рівноваги мікрофлори даного біотопу [13, 23, 28]. Результати мікробіологічного дослідження посівів з лакун піднебінних мигдаликів пацієнтів групи використання «Біоплазмікс спреї для горла» та групи застосування декаметоксину до початку та після лікування відображені в табл. 1 та 2.

Таблиця 1

Видовий склад мікробіоти, виділеної від хворих на ХТ, група використання «Біоплазмікс спреї для горла»

Вид мікроорганізму	Кількість штамів,	
	до лікування	на 10-у добу лікування
<i>Staphylococcus aureus</i>	13	5
<i>Коагулазонегативні стафілококи</i>	24	24
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	2	-
<i>Streptococcus pyogenes</i>	14	3
<i>Enterococcus faecalis</i>	2	-
<i>Альфа и гамма гемолітичні стрептококи</i>	26	26
<i>Neisseria spp.</i>	26	26
<i>Escherichia coli</i>	1	-
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	3	1
<i>Candida albicans</i>	9	2
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1	-

Таблиця 2

Видовий склад мікробіоти, виділеної від хворих на ХТ, група застосування декаметоксину

Вид мікроорганізму	Кількість штамів	
	до лікування	на 10-у добу лікування
<i>Staphylococcus aureus</i>	13	6
Коагулазонегативні стафілококи	25	18
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	2	-
<i>Streptococcus pyogenes</i>	13	2
<i>Enterococcus faecalis</i>	3	-
Альфа и гамма гемолітичні стрептококи	26	19
<i>Neisseria spp.</i>	26	17
<i>Escherichia coli</i>	-	-
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	2	-
<i>Candida albicans</i>	11	5
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1	-

Під час мікробіологічного дослідження матеріалу з піднебінних мигдаликів від 52 пацієнтів обох груп з ХТ було виділено 243 бактеріальних штами. Мікробний пейзаж піднебінних мигдаликів при хронічному тонзиліті характеризувався значним різноманіттям. Поруч з патогенною флорою виявлялися умовно-патогенні та сапрофітні мікроорганізми. За даними мікробіологічного дослідження у всіх пацієнтів висівалися альфа- та гама-гемолітичні стрептококи, а також *Neisseria spp.* Альфа-гемолітичні стрептококи в основному були представлені *Streptococcus viridans*, популяційний рівень яких визначався в межах $10^3 - 10^6$ КУО/мл. Серед виділених клінічних ізолятів патогенної мікрофлори переважали штами *St. pyogenes*, що висівалися в 51,9% хворих на ХТ. Даний вид мікроорганізмів було виділено в монокультури та в асоціаціях з іншими мікробами, кількістю в межах $10^4 - 10^6$ КУО/мл. Визначення бактеріального навантаження даного збудника є клінічно значимим, оскільки його персистенція може спричиняти розвиток метатонзиллярних ускладнень (ревматизм, поліартрит, гломерулонефрит, міокардит тощо) [1, 18, 21]. Друге місце за частотою виділення займали представники роду *Staphylococcus*. Коагулазо-негативні стафілококи були виділені у 94,2% обстежуваних, а їхній показник мік-

робного обсіменіння коливалася в межах $10^4 - 10^6$ КУО/мл. Штами коагулазо-позитивних стафілококів (*S. aureus*) висівалися в 50% випадків. Кількісний показник коагулазо-позитивних стафілококів визначався в діапазоні $10^5 - 10^6$ КУО/мл. Підвищення популяційного рівня *S. aureus* не є нормальним для даного біотопу здорових осіб, і може спричиняти розвиток багатьох запальних захворювань. Одержані результати мікробіологічного дослідження свідчать про порушення мікробіоценозу піднебінних мигдаликів.

У 19,1% пацієнтів були виділені інші потенційні патогени, такі як *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus faecalis*. Асоціації патогенних мікроорганізмів виділялись більш, ніж у 60% хворих на ХТ обох досліджуваних груп. Наявність мікробних консорціумів може супроводжуватися синергізмом дії асоціантів, що посилює їх патогенний потенціал. Слід пам'ятати про можливість проникнення патогенних мікроорганізмів в структуру біоплівки та їх закріплення в ній. Активна колонізація слизової оболонки ротоглотки такими мікробними угрупованнями здатна порушувати гомеостаз клітин слизових оболонок, і ускладнювати перебіг запальних захворювань. Формування складних мікробних спільнот свідчить про необхідність санації хронічних осередків інфекції.

Результати повторного мікробіологічного дослідження на 10-у добу лікування в групі використання «Біоплазмікс спреї для горла» показали ерадикацію *St. pyogenes* у 78,5% випадків, при цьому в інших 21,5% обстежених даний вид мікроорганізмів продовжував виділятися, але показник КУО/мл зменшувався, принаймні, в 100 разів (до 10^2 - 10^3). Мікроорганізми видів *Streptococcus pneumoniae* та *Enterococcus faecalis* не були виявлені в жодному випадку. Враховуючи, що провідним етіологічним фактором у розвитку хронічного запалення піднебінних мигдаликів є мікроорганізми родини *Streptococcaceae*, одержані результати можуть свідчити про зниження ризиків розвитку декомпенсованого хронічного тонзиліту та тонзилогенних ускладнень з боку інших органів і систем. Мікробіологічна ефективність «Біоплазміксу спрею для горла» спостерігалася і по відношенню до *S. aureus*. У 61,5% пацієнтів відбулася ерадикація даного патогена, а у інших 38,5% хворих *S. aureus* продовжував виділятися при зменшенні бактеріального навантаження до 10^3 - 10^4 КУО/мл. Аналіз динаміки грам-негативної мікрофлори встановив ерадикацію *Escherichia coli* та зменшення випадків виділення *Pseudomonas aeruginosa* на 66,6%. Повторне мікологічне дослідження показало елімінацію *Candida albicans* у 77,7% пацієнтів та зниження популяційного рівня даного патогена у 100 разів і більше у 22,3% хворих, в яких продовжував виділятися даний збудник. На тлі використання «Біоплазмікс спрею для горла» виявляється мікробних асоціацій патогенної флори з сапрофітною зменшилася в 4,7 разів.

Результати проведених досліджень свідчать, що в умовах повної ерадикації патогенів або зниження їх чисельності, щільність колонізації представників облигатної резидентної мікрофлори залишалася сталою або мала тенденцію до зростання, що відповідало бактеріологічному навантаженню, характерному для даного біотопу в нормі, і свідчило про покращення якісного співвідношення сапрофітної та патогенної мікрофлори.

Клінічні та мікробіологічні ефекти «Біоплазміксу спрею для горла» в лікуванні ХТ пов'язані з біологічними властивостями

бактерій, що входять до його складу. На сьогодні відомо більше 66 природних протимікробних субстанцій, більшість з яких представлена нерибосомними та рибосомними пептидами, а також непептидними речовинами, які синтезуються даними мікроорганізмами в процесі життєдіяльності. Зазначені субстанції здатні вибірково пригнічувати ріст та розмноження патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, які можуть входити до складу біоплівки даного біотопу. Бактеріальний компонент «Біоплазмікс спреї для горла» характеризується підвищеною стійкістю до специфічних та неспецифічних механізмів імунного захисту макроорганізму та набутою резистентністю до дії антимікробних хіміопрепаратів [3, 24]. За результатами проведених досліджень, така селективна дія «Біоплазміксу спрею для горла» сприяла нормалізації показників щільності колонізації представників індигенної флори, що свідчить про відновлення колонізаційної резистентності біотопу.

Аналіз мікробного профілю пацієнтів групи застосування декаметоксину показав, що найбільш чутливим до дії декаметоксину виявилися *Enterococcus faecalis* та *Pseudomonas aeruginosa*. Також високу антисептичну активність має декаметоксин по відношенню до *St. pyogenes*, ерадикація збудника спостерігалася у 84,6% пацієнтів. Виразений антибактеріальний ефект демонстрував декаметоксин і по відношенню до *S. aureus*, повторне виділення даного виду мікроорганізмів мало місце лише у 23,1% випадків. Протигрибкова дія декаметоксину була менш вираженою, ніж у «Біоплазміксу спрею для горла», оскільки ерадикація *C. albicans* спостерігалася лише у 54,5% хворих. Слід зауважити, що в результаті лікування декаметоксином висіваємість асоціацій патогенних мікроорганізмів з сапрофітними представниками нормальної мікрофлори зменшилась у 5 разів. Так, значущої різниці між показниками групи використання «Біоплазмікс спреї для горла» і групи застосування декаметоксину не відмічалось.

Протимікробний ефект декаметоксину обумовлений механізмом його дії, який полягає в підвищенні проникності цитоплазматичної мембрани мікробної клітини з

подальшою її деструкцією, пригніченні синтезу білка мікроорганізмів та їх поділу, а також в інактивації екзотоксину. Проте, на відміну від «Біоплазміксу спрею для горла», широкий спектр дії препарату не сприяє відновленню та збереженню високого популяційного рівня індигенної мікрофлори піднебінних мигдаликів.

Таким чином, доведено доцільність використання «Біоплазміксу спрею для горла» при хронічному тонзиліті та встановлено ряд його переваг, які, перш за все, полягають в нормалізації мікробного профілю ротоглотки та відновленні колонізаційної резистентності даного біотопу.

Висновки

1. «Біоплазмікс спреї для горла» під час лікування хворих на хронічний тонзиліт сприяв зменшенню вираженості скарг пацієнтів та позитивній динаміці об'єктивних ознак захворювання.

2. «Біоплазмікс спреї для горла» продемонстрував селективну антагоністичну активність по відношенню до основних збудників хронічного тонзиліту.

3. Під дією «Біоплазміксу спрею для горла» відбулася нормалізація кількісного та якісного складу аутохтонної мікрофлори піднебінних мигдаликів, що сприяло відновленню мікроекології даного біотопу.

Література

1. Aksenova AV, Shostak NA, Guseva OA. [The post-streptococcal diseases in the clinical practice]. *Bul. otorhinolaryngol.* 2016;81(2):39-43. [Article in Russian]. doi: 10.17116/otorino201681239-43.
2. Belov BS, Grishayeva TP. [A-Streptococcal tonsillitis: modern aspects of antibacterial therapy]. *Pediatr. pharmacol.* 2007;4(3):58-66. [Article in Russian].
3. Berezhnoi VV, Korneva VV. [Opportunities and prospects of use of domestic probiotic based on spore-forming bacteria in pediatric practice]. *Sovremennaya pediatriy.* 2015;7(71):43-50. [Article in Russian].
4. Bojko VV, Ivanova YuV, Golovina OA. [Antibiotic resistance of major intra-abdominal infections agents (Literature review and original study)]. *Surg. Ukraine.* 2016;4:108-16. [Article in Ukrainian].
5. Herasymyuk MI. [The optimization of diagnosis and choice of treatment of patients with chronic tonsillitis by identifying the subpopulation composition of lymphocytes in blood and tissue of the tonsils] [dissertation]. Ternopil: Ternopil State Medical University named after I. Horbachevskyi; 2018. 187 p. [In Ukrainian].
6. Zakharova OI, Liskova EA, Mikhaleva TV, Blokhin AA. [Antibiotic resistance: evolutionary prerequisites, mechanisms, consequences]. *Agrarnay nauka Evro-Severo-Vostoka.* 2018;64(3):13-21. doi: 10.30766/2072-9081.2018.64.3.13-21. [Article in Russian].
7. Kindrat HV, Havrylyuk NS, Yatsynovych NM. [Oral microbiocenosis in patients with gastrointestinal tract disorders]. *Modern gastroenterol.* 2015;6(86):39-44. [Article in Ukrainian].
8. Knysh OV. [Theoretical and experimental justification for a new direction of metabiotics creation based on the Bifidobacterium bifidum and Lactobacillus reuteri derivatives] [dissertation]. Kharkiv: I. Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology National Academy of Medical Sciences of Ukraine; 2021. 386 p. [In Ukrainian].
9. NI. Kovalenko, comp. [Normal microflora and microflora in pathological processes of the oral cavity: method. instructions. for students of II-III courses in the specialties "Medicine", "Pediatrics", "Dentistry" educational qualification level "Master"]. Kharkiv: KhNMU; 2021. 52 p. [In Ukrainian].
10. Svintsytskyi AS. [Intestinal dysbiosis and reactive arthritis]. *Health of Ukraine.* 2007;7(1):3-5. Available from: <https://health-ua.com/article/17590-kishkoviy-disboz-ta-reaktyvnyj-artrit> [Article in Ukrainian].
11. Maltseva GS, Karpishchenko SA. [The role of herbal medicine in the treatment of chronic tonsillitis]. *Med. sovet.* 2020;6:36-43. <http://doi.org/10.21518/2079-701X-2020-6-36-43> [Article in Russian].
12. Melnikov OF, Zabolotny DI, Kishchuk VV, Bredun AYU, Rylskaya OG. [Immunology of chronic tonsillitis: monograph]. Kiev: Logos; 2017. 192 p. [In Russian].
13. Mikhailova EA, Fomina MV, Kirgizova SB. [Microbial ecology of palatine tonsils in patients with chronic tonsillitis]. *Bull. Orenburg State Univer.* 2015;10(185):270-2. [Article in Russian].
14. Mikhaleva TV, Ilyasov PV, Zakharova OI. [Antibiotic resistance: modern approaches and ways to overcome it (review)]. *Applied Biochemistry and*

- Microbiol. 2019;55(2):124-32. doi: 10.1134/S0555109919020119. [Article in Russian].
15. Vandepitte J, Engbaek K, Piot P, Heuck C. & World Health Organization. [Basic laboratory procedures in clinical bacteriology]. Geneva, Moscow: Medicine; 1994. 132 p. [In Russian].
 16. Holt J, Krieg N, Smith P, Staley J, Williams S, editors. [Bergey's Manual of Systematic Bacteriology]. Vol. 1. Moscow: Mir; 1997. 430 p. [In Russian].
 17. Holt J, Krieg N, Smith P, Staley J, Williams S, editors. [Bergey's Manual of Systematic Bacteriology]. Vol. 2. Moscow: Mir; 1997. 461 p. [In Russian].
 18. Pal'chun VT, Kriukov AI, Gurov AV, Dubovaya TK, Ermolaev AG. [Morphofunctional condition of palatine tonsils in various forms of chronic tonsillitis]. Med. Sovet. 2020;(16):150-9. <http://doi.org/10.21518/2079-701X-2020-16-150-159>. [Article in Russian].
 19. Pogorelova OO. [Substantiation and effectiveness of new methods of pathogenetic therapy of acute respiratory infections in children] [dissertation]. Moscow; 2017. 162p. [In Russian].
 20. Popovich VI. [Chronic tonsillitis and tonsillogenic diseases]. Health of Ukraine. 2014; Feb: 44-5. [Article in Ukrainian].
 21. Ryazantsev SV, Eremina NV, Scherban KY. [Modern methods to treat chronic tonsillitis]. Med. Sovet. 2017;19:68-72. [Article in Russian].
 22. Savlevich EL, Ivanova MA, Mokronosova MA, Gorbunov SA, Yakushenkova AP. [Seasonal features of the microbial landscape of palatine tonsils in healthy students]. J. Microbiol. Epidemiol. Immunobiol. 2018;5:98-103. [Article in Russian].
 23. Svistushkin VM, Nikiforova GN, Shevchik EV, Zolotova AV, Volkova KB. [Possibilities of topical etiotropic therapy of chronic tonsillitis patients]. Med. Sovet. 2016;18:116-20. [Article in Russian].
 24. Skrypnyk IN, Maslova GS. [Modern spore-creating probiotics in clinical practice]. Modern Gastroenter. 2009;3(47):81-90. [Article in Ukrainian].
 25. [Tonsillitis. Evidence-based clinical guideline]. Kyiv; 2021. [In Ukrainian]. Available from: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/2021_639_kn_tonzylit.pdf.
 26. Khusnutdinova LM. [Microflora of the mucous membrane of human tonsils in the normal state and in pathology]. J. Microbiol. Epidemiol. Immunobiol. 2006;1:60-3. [Article in Russian].
 27. Yakovlev SV. [Programs of microbiological diagnostics and antibacterial therapy of sepsis]. Infections and antimicrobial therapy. 2001;3(3):2-6. [Article in Russian].
 28. Yampolskaya KYe. [Features of diagnosis and treatment of children with chronic tonsillitis and concomitant pathology of the dentoalveolar system] [dissertation]. Kharkiv: Medical Academy of Postgraduate Education; Kyiv: State institution «O. S. Kolomiychenko Institute of otolaryngology of National academy of medical sciences of Ukraine»; 2017. 159 p. [In Ukrainian].
 29. Bush K, Jacoby GA. Updated Functional Classification of beta-Lactamases. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2010;54(3):969-76. doi: 10.1128/aac.01009-09.
 30. Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria: Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation of Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food Including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria. Available from: <https://www.fao.org/3/y6398e/y6398e.pdf>
 31. Soto SM. Role of efflux pumps in the antibiotic resistance of bacteria embedded in a biofilm. Virulence. 2013;4(3):223-9. doi: 10.4161/viru.23724.
 32. Zaman K, Ghoti MA, Suheryani I, Ansari IT, Dayo A, Naeem S, et al. Evaluation of prescribing frequency and pattern of antimicrobial therapy in patients with acute tonsillitis at tertiary care hospital of Hyderabad, Sindh, Pakistan. Lat Am J Pharm. 2021;40(6):1246-50. http://www.latamjpharm.org/previous_issue.php?vol=40&num=6

Надійшла до редакції 20.12.2021

© С.Б. Безшапочний, В.П. Полянська, С.В. Зачепило

КЛІНІЧНА ТА МІКРОБІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ «БІОПЛАЗМІКСУ СПРЕЮ ДЛЯ ГОРЛА» В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ

¹Безшапочний СБ, ²Полянська ВП, ¹Зачепило СВ
¹Кафедра оториноларингології з офтальмологією;
²Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Полтавського державного медичного університету
Email: s.v.zachepilo@gmail.com

А н о т а ц і я

Актуальність: Хронічні запальні захворювання мигдаликів займають значиме місце в структурі оториноларингологічної патології. Перехід запалення в хронічну форму пов'язаний з пригніченням факторів колонізаційної резистентності даного біотопу, появою патогенних мікроорганізмів, таких як *St. pyogenes* та *S. aureus*. На тлі дисбіозу, що формується, та імунного дисбалансу можливий розвиток ряду ускладнень з боку органів і систем. Тому пошук засобів для ефективного топічного етіотропного лікування хронічного тонзиліту та, водночас, щадних до автохтонної мікрофлори, є актуальним.

Матеріали та методи: В дослідженні брали участь 52 хворих на хронічний тонзиліт. Всіх обстежених було розподілено на 2 групи по 26 осіб в кожній. Пацієнти 1-ї групи в місцевій терапії використовували бактерійний компонент «Біоплазмікс спреї для горла», а пацієнти 2-ї групи застосовували традиційний курс лікування: промивання лакун мигдаликів антисептичним засобом – декаметоксином в концентрації 0,2 мг/мл.

Результати та обговорення: Проведені дослідження показали селективну протимікробну активність «Біоплазміксу спреї для горла». Так, по відношенню до основних патогенів «Біоплазмікс спреї для горла» проявляв виражену антибактеріальну дію та, в той же час, сприяв нормалізації показників популяційного рівня представників індигенної мікрофлори, що свідчить про відновлення колонізаційної резистентності біотопу. Позитивна динаміка основних скарг хворих та фарингоскопічних ознак свідчила про клінічну ефективність «Біоплазміксу спреї для горла». Аналіз клінічних показників пацієнтів 2-ї групи демонстрував зменшення вираженості скарг пацієнтів та об'єктивних ознак захворювання під час лікування декаметоксином. Результати повторного мікробіологічного дослідження встановили, що, на відміну від «Біоплазміксу спреї для горла», широкий спектр протимікробної дії декаметоксину не сприяє відновленню та збереженню високого популяційного рівня індигенної мікрофлори піднебінних мигдаликів.

Ключові слова: хронічний тонзиліт, індигенна мікрофлора, колонізаційна резистентність.

CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL EFFICACY OF "BIOPLASMIX THROAT SPRAY" IN THE TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES OF THE PALATINE TONSILS

¹Bezshapochny SB, ²Polianskaya VP, ¹Zachepilo SV
Department of Otorhinolaryngology and Ophthalmology;
Department of Microbiology, Virology and Immunology
Poltava State Medical University
Email: s.v.zachepilo@gmail.com

Abstract

Topicality: Chronic inflammatory diseases of the tonsils occupy a significant place in the structure of otorhinolaryngological pathology. The transition of inflammation to a chronic form is associated with the suppression of factors of colonization resistance of this biotope, the emergence of pathogenic microorganisms such as *St. pyogenes* and *S. aureus*. Against the background of developing dysbiosis and immune imbalance, a number of complications from organs and systems may develop. Therefore, the search for means for effective topical etiotropic treatment of chronic tonsillitis and, at the same time, gentle on the indigenous microflora, is relevant.

Materials and methods: The study involved 52 patients with chronic tonsillitis. All patients were divided into 2 groups of 26 each. Subjects of the 1st group in local therapy used the bacterial component "Bioplasmix throat spray", and patients in the 2nd group – used the traditional course of treatment: washing the lacunae of the tonsils with antiseptic agent – decamethoxine at a concentration of 0.2 mg/ml.

Results and discussion: Studies have shown the selective antimicrobial activity of "Bioplasmix Throat Spray". Thus, in relation to the main pathogens "Bioplasmix Throat Spray" showed a pronounced antibacterial effect and, at the same time, helped to normalize the population level of indigenous microflora, which indicates

the restoration of colonization resistance of the biotope. The positive dynamics of the main complaints of patients and pharyngoscopic signs testified to the clinical effectiveness of "Bioplasmix Throat Spray". The analysis of clinical indicators in patients of the 2nd group showed a decrease in the severity of patient complaints and objective signs of the disease during treatment with decamethoxine. The results of repeated microbiological studies showed that, unlike "Bioplasmix Throat Spray", the broad spectrum of antimicrobial action of decamethoxine does not contribute to the restoration and maintenance of high population levels of indigenous microflora of the palatine tonsils.

Key words: chronic tonsillitis, indigenous microflora, colonization resistance.